EXERCICE 1

1. Soit $\mathcal{P}_n$ la propriété : « $u_n \geq 4$ »

Initialisation : $u_0 = 7 \geq 4$ donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité : Soit k un entier naturel tel que $\mathcal{P}_k$ est vraie, i.e. tel que $u_k \geq 4$.

Dans ces conditions, $u_k + 12 \geq 16$ et, la fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0; +\infty[$, $\sqrt{u_k + 12} \geq \sqrt{16}$ soit encore $u_{k+1} \geq 4$ d'où $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

On a ainsi démontré que $\mathcal{P}_k$ vraie implique $\mathcal{P}_{k+1}$ vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}_n$ est vraie pour $n=0$ et est héréditaire à partir de ce rang donc elle est vraie pour tout entier naturel n .

2. Commençons par remarquer que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (4 - u_n)(3 + u_n) = 12 + 4u_n - 3u_n - u_n^2 \\ = -u_n^2 + u_n + 12$$

De là :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n = \frac{\sqrt{u_n + 12} - u_n}{(\sqrt{u_n + 12} - u_n)(\sqrt{u_n + 12} + u_n)} \\ = \frac{\sqrt{u_n + 12} + u_n}{(\sqrt{u_n + 12})^2 - u_n^2} \\ = \frac{\sqrt{u_n + 12} + u_n}{-u_n^2 + u_n + 12} \\ = \frac{\sqrt{u_n + 12} + u_n}{(4 - u_n)(3 + u_n)} \\ = \frac{\sqrt{u_n + 12} + u_n}{\sqrt{u_n + 12} + u_n}$$

3. Pour tout entier naturel n , $u_n \geq 4$ donc $4 - u_n \leq 0$, $3 + u_n \geq 7 > 0$ et $\sqrt{u_n + 12} + u_n \geq 8 > 0$ donc $\frac{(4 - u_n)(3 + u_n)}{\sqrt{u_n + 12} + u_n} \leq 0$, ce qui équivaut à $u_{n+1} - u_n \leq 0$ soit encore à $u_{n+1} \leq u_n$.

Conclusion : (u_n) est décroissante.

EXERCICE 2

1. Réponse exacte : $\mathcal{C}_p$ admet exactement une asymptote horizontale et une verticale.

Explications : $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = +\infty$ donc la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_p$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = 2$ donc la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_p$.

$\mathcal{C}_p$ n'admet pas d'autre asymptote car la limite de p en $-\infty$ est infinie et que la limite de p en 6 est finie.

2. Réponse exacte : La courbe de f n'admet pas d'asymptote verticale.

Explications : f étant dérivable sur $\mathbb{R}$, f ne peut admettre de limite infinie en un réel et sa courbe ne peut donc admettre d'asymptote verticale.

3. Réponse exacte : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 4}{f(x)} = 1$

Explications : Pour x suffisamment grand, $\frac{f(x) + 4}{f(x)} = \frac{f(x)}{f(x)} + \frac{4}{f(x)} = 1 + \frac{4}{f(x)}$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{4}{f(x)} = 1$ d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 4}{f(x)} = 1$.

Les deux autres propositions correspondent à des cas d'indétermination (respectivement « $\infty - \infty$ » et « $0 \times \infty$ »).

4. Réponse exacte : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1 - x) = 1$

Explications : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 1$ donc, par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(1 - x) = 1$.

Pour ce qui concerne les deux autres propositions, les limites exactes sont $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - f(x))^3 = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$.

5. Réponse exacte : $g(x) = \frac{3x^2}{(x-2)^2}$

Explications : La courbe représentative de g admet pour asymptotes les droites d'équations $x = 2$ et $y = 3$ donc g est une fonction non définie en 2 et qui admet pour limite 3 en $-\infty$ ou en $+\infty$.

$x \mapsto \frac{3x^2}{x^2 - 2}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$ et peut donc être écartée.

$x \mapsto \frac{3x^2}{x-2}$ et $x \mapsto \frac{3x^2}{x^2 - 2}$ sont deux fonctions rationnelles. Or, en l'infini, une fonction rationnelle admet même limite que le quotient simplifié des termes de plus haut degré de son numérateur et de son dénominateur.

$\forall x \neq 0 \quad \frac{3x^2}{x} = 3x$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{x-2} = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x-2} = +\infty$ d'où l'on peut écartier l'expression $\frac{3x^2}{x-2}$.

$g(x)$ ne peut être que $\frac{3x^2}{(x-2)^2}$. On peut d'ailleurs vérifier que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2}{(x-2)^2} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{(x-2)^2} = 3$.

6. Réponse exacte : $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} h(x) = +\infty$

Explications : $\lim_{x \rightarrow 3} -2x + 1 = -5$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} x - 3 = 0^{(-)}$ donc, par quotient, $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} h(x) = +\infty$.

7. Réponse exacte : k a une limite en $+\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 1$.

Explications : Il suffit d'appliquer le théorème des gendarmes.

$\forall x > 0 \quad 1 + \frac{2}{x} < k(x) < 1 + \frac{3}{x}$; or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{3}{x} = 1$ donc, d'après le théorème des gendarmes, k admet une limite en $+\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = 1$.

8. Réponse exacte : k a une limite à droite en 0 et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} k(x) = +\infty$.

Explications : Il suffit d'appliquer un théorème de comparaison (ici, théorème de minoration).

$\forall x > 0 \quad k(x) > 1 + \frac{2}{x}$; or, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 + \frac{2}{x} = +\infty$ donc k admet une limite à droite en 0 et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} k(x) = +\infty$.

EXERCICE 3

- La section du cube par le plan (MNP) est un hexagone. L'intersection des plans (MNP) et (ADH) est la parallèle à (MN) qui passe par P .
En effet, (BCG) et (ADH) sont parallèles et, si deux plans sont parallèles alors tout plan qui coupe l'un, coupe l'autre, et les droites d'intersection sont parallèles.
- Méthode : Pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'elle est parallèle à une droite incluse dans ce plan.
Dans le triangle BCF , les points B, M, F , d'une part, et B, N, C , d'autre part, sont alignés dans cet ordre et $\frac{BM}{BF} = \frac{BN}{BC} = \frac{3}{4}$ donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (FC) sont parallèles.
Comme (FC) est incluse dans le plan (EDF) , la droite (MN) est parallèle au plan (EDF) .
- Méthode : Pour montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer qu'elle est orthogonale à deux droites sécantes incluses dans ce plan (théorème de la porte).
La droite (AB) est perpendiculaire au plan (BCF) (car elle est perpendiculaire à (BC) et à (BF) qui sont deux droites sécantes incluses dans le plan (BCF)) donc elle est orthogonale à toute droite incluse dans ce plan donc, en particulier, à (MN) .
 (BG) et (FC) sont perpendiculaires car ce sont les diagonales du carré $BCGF$. Or, (MN) est parallèle à (FC) donc (MN) est orthogonale (et même perpendiculaire) à (BG) .
Ainsi, (MN) est orthogonale à (BG) et à (AB) , droites sécantes incluses dans le plan (ABH) , d'où (MN) est perpendiculaire à ce plan.
- Méthode : Pour montrer que deux plans sont perpendiculaires, il suffit de montrer que l'un contient une droite perpendiculaire à l'autre.

La droite (MN) est perpendiculaire à (BG) . La première étant incluse dans le plan (MNE) et la seconde étant incluse dans le plan (ABH) , le plan (MNE) contient une droite perpendiculaire au plan (ABH) donc ces deux plans sont perpendiculaires.

- Les plans (MNA) et (EDF) ne sont ni confondus (car A n'appartient pas à (EDF)) ni strictement parallèles (car le point d'intersection des droites (AM) et (EF) , que l'on nomme Q dans la suite) appartient à chacun de ces deux plans) donc ils sont sécants et leur intersection est une droite qui passe par Q .

Méthode 1 : (MN) est parallèle à (MNA) (car incluse dans celui-ci) et à (EDF) (car parallèle à (FC) , droite incluse dans (EDF)) donc elle est parallèle à la droite d'intersection de ces deux plans.

En effet, si une droite est parallèle à deux plans sécants alors elle est parallèle à leur droite d'intersection (théorème du toit).

Conclusion : L'intersection des plans (MNA) et (EDF) est la droite parallèle à (MN) qui passe par Q .

Méthode 2 : (AN) et (CD) sont sécantes en un point que l'on nomme R .

(AN) étant incluse dans (MNA) et (CD) étant incluse dans (EDF) , le point R appartient à (MNA) et à (EDF) .

Conclusion : L'intersection des plans (MNA) et (EDF) est la droite (QR) .

- Méthode : Pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que deux droites sécantes incluses dans le premier sont respectivement parallèles à deux droites incluses dans le second.

Le plan (BDE) est strictement parallèle à (FHC) .

En effet, (BE) et (BD) sont deux droites sécantes incluses dans le plan (BDE) et sont respectivement parallèles à (CH) et (FH) , droites incluses dans le plan (FHC) .